

Dr.Max⁺**Simethicone Baby**

Perorální kapky

Výrobek obsahuje

Simethicon v olivovém oleji, vitamin A, vitamin E, koenzym Q.

Terapeutické indikace

Simethicone Baby je zdravotnický prostředek určený pro léčbu poruch trávení, nadýmání a střevní koliky u kojenců, dětí nebo dospělých.

Doporučené dávkování**Kojenci:** 20 kapek, ideálně po jídle, 1×–2× denně nebo dle lékařského doporučení.**Děti od 1 roku:** 20 kapek, ideálně po jídle, 1×–3× denně nebo dle lékařského doporučení.**Dospělí:** 20–40 kapek, ideálně po jídle, 2×–4× denně nebo dle lékařského doporučení.

Jedna dávka (20 kapek) obsahuje 40 mg simethiconu.

Způsob použití

Před použitím dobře protřepejte. Po použití láhev dobře uzavřete. V případě potřeby je možné rozpustit kapky v nápoji. Pokud během použití kapátko omylem znečistíte, omyjte ho pečlivě předtím, než ho vložíte zpátky do lahvičky, abyste zabránili případné kontaminaci.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě důkladně uzavřené a mimo zdroje tepla. Po otevření používejte přípravek nejdéle 30 dní.

Upozornění

Přípravek není určený pro preventivní užívání.

Přípravek může mít formu dvou oddělených vrstev.

Po protřeptání se spojí v homogenní emulzi.

Ukládejte mimo dosah dětí.

Neprekračujte doporučené dávkování.

Produkt neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k neporušenému produktu, který byl správně skladován.

Nepoužívejte produkt, pokud bylo balení poškozeno.

Všechny složky, ze kterých se produkt skládá, včetně kapátká, musejí být neporušené.

Pokud nezaznamenáte po krátké době léčby (7 dní) významné zlepšení, obraťte se na svého lékaře.

Přípravek nepoužívejte déle než 30 dní. Pokud se u vás projeví jakékoliv nežádoucí vedlejší účinky, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě přecitlivlosti na jednotlivé složky přípravku.

Vzájemné působení přípravku Simethicone Baby s ostatními přípravky

Nejsou známy žádné interakce simethiconu s léky nebo jinými farmaceutickými přípravky.

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Nejsou známy žádné údaje o používání přípravku v těhotenství. Preto by těhotné ženy neměly přípravek používat, pokud lékař neposoudí jinak.

Kojení: Klinické údaje o přecházení simethiconu do mateřského mléka nejsou k dispozici. Proto by kojící ženy neměly produkt používat, pokud lékař neposoudí jinak.

Vliv na schopnost řídit

Nebyly zjištěny žádné účinky na schopnost řídit auto a obsluhovat stroje.

Možné nežádoucí účinky a předávkování

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. Nebyly zaznamenány žádné případy předávkování.

Velikost a obsah balení

Zdravotnický prostředek Simethicone Baby je olejový roztok balený v lahvičkách o obsahu 30 ml s příloženým kapátkem.

Likvidace nespotebaveného přípravku

Nepoužitý prostředek Simethicone Baby musí být zlikvidován v souladu s příslušnými právními předpisy dle místní autority zodpovědné za nakládání s odpady. V žádném případě nevyhazujte tento přípravek do odpadních vod ani do domácího odpadu, toto opatření má chránit životní prostředí.

Datum poslední revize: 10/2019 **SIIT srl, Via Ariosto 50/60, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), ITALY****Distributor:** Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika**Dr.Max⁺****Simethicone Baby**

Perorálne kvapky

Výrobek obsahuje

Simetikon v olivovom oleji, vitamín A, vitamín E, koenzým Q.

Terapeutické indikácie

Simethicone Baby je zdravotnícka pomôcka určená na liečbu porúch trávenia, nadúvania a črevnej koliky u dojčiat, detí alebo dospelých.

Odporúčané dávkovanie**Dojčatá:** 20 kvapiek, ideálne po jedle, 1×–2× denne alebo podľa lekárskeho odporúčania.**Deti od 1 roka:** 20 kvapiek, ideálne po jedle, 1×–3× denne alebo podľa lekárskeho odporúčania.**Dospelí:** 20–40 kvapiek, ideálne po jedle, 2×–4× denne alebo podľa lekárskeho odporúčania.

Jedna dávka (20 kvapiek) obsahuje 40 mg simetikonu.

Spôsob použitia

Pred použitím dobre pretrepte. Po použití fľašu dobre uzavrite. V prípade potreby je možné rozpustiť kvapky v nápoji. Ak sa počas používania kvapkadlo omylom znečistí, umyte ho dôkladne pred tým, ako ho vložíte naspäť do fľaštičky, aby ste zabránili prípadnej kontaminácii.

Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote, dôkladne uzatvorené a mimo zdroja tepla. Po otvorení používajte prípravek najviac 30 dní.

Kontraindikácie

Nepoužívajte v prípade precitlivosti na niektorú zo zložiek prípravku.

Upozornenie

Přípravek nie je určený na preventívne používanie. Přípravek môže mať formu dvoch oddělených vrstev.

Po pretrepaní sa spoja do homogénnej emulzie.

Uskladňujte mimo dosahu malých detí.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Produkt neužívejte po uplynutí lehoty použitelnosti uvedené na obale. Lehota použitelnosti sa vztahuje na neporušený produkt, ktorý bol správne skladovaný.

Nepoužívejte produkt, ak bolo balení poškozené.

Všetky složky, z kterých sa produkt skládá, vrátane kvapkadla, musia byť neporušené.

Ak nezaznamenáte po krátkom čase liečby (7 dní) významné zlepšení, obraťte sa na svojho lekára.

Přípravek nepoužívejte dlhšie ako 30 dní od otvorenia. Ak sa u vás prejavia akékoľvek nežiaduce účinky, kontaktujte svojho lekára alebo lekárníka.

Vzájemné působení přípravku Simethicone Baby s ostatními přípravkami

Nie sú známe žiadne interakcie simetikonu s liekmi alebo inými farmaceutickými prípravkami.

Tehotensvo a dojčenie

Tehotensvo: Nie sú známe žiadne údaje o používaní prípravku v tehotenstve. Preto by tehotné ženy nemali prípravek používať, ak lekár neposoudí jinak.

Dojčenie: Klinické údaje o přecházení simetikonu do mateřského mléka nie sú k dispozici. Preto by dojčiaci ženy nemali prípravek používať, ak lekár neposoudí jinak.

Vplyv na schopnosť viesť vozidlo

Neboli zistené žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Možné nežiaduce účinky a predávkovanie

Neboli zistené žiadne nežiaduce účinky. Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania.

Veľkosť a obsah balenia

Zdravotnícka pomôcka Simethicone Baby je olejový roztok balený vo fľaštičkách s obsahom 30 ml s príloženým kvapkadlom.

Likvidácia nespotebaveného prípravku

Nepoužitý produkt Simethicone Baby musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi podľa miestnej autority zodpovednej za zaobchádzanie s odpadmi.

V žiadnom prípade nevyhazujte tento prípravek do odpadových vôd alebo do domáceho odpadu, toto opatrenie má chrániť životné prostredie.

Datum poslednej revízie: 10/2019 **SIIT srl, Via Ariosto 50/60, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), ITALY****Distributor:** Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika